

8. Ergänzungen.

Die Bürgerschaft hat folgende Deputationen ergänzt:

- 1) Die Schuldeputation durch Herrn Stegmann an die Stelle des Herrn D. Engelken;
- 2) die Deputation wegen der Consumtion, Umsatzsteuer u. s. w. durch Herrn J. M. Wulstein an die Stelle des Herrn J. Falkenburg;
- 3) die Deputation wegen der Wasserleitung durch Herrn J. H. Drünert an die Stelle des Herrn J. G. W. Finke.

Mittheilung des Senats an die Bürgerschaft

vom 20. September 1867.

1. Blockländer Entwässerungsanstalt.

Auch der Senat genehmigt die beantragte Nachbewilligung von 4000 Thalern auf das Budget für Betriebs- und Unterhaltungskosten der Blockländer Entwässerungsanstalt und wird die gewünschte Berichterstattung der Convoyedeputation veranlassen.

2. Vereinigung der Erhebungen der directen und indirecten Steuern mit der Erhebung der Consumtionsabgabe, Umsatzsteuer, Declarations- und Schifffahrtsabgabe und

3. Ausbau des Lindenhofs.

Der Senat tritt nunmehr den Beschlüssen der Bürgerschaft vom 3. Juli d. J. unbedingt bei und bewilligt daher seiner Seits ebenfalls die für den Lindenhof veranschlagten 4200 Thaler, hat auch die Baudeputation beauftragt, im Einvernehmen mit den Deputationen für die Umsatzsteuer und die Finanzen den Ausbau des Lindenhofs nach Maßgabe des Berichts vom 5. September d. J. in Ausführung zu bringen.

2. Ergebnisse.

Die Ergebnisse der folgenden Experimente sind:

- 1) Die Schmelztemperatur des Stearins am die Stelle des Stearins.
- 2) Die Schmelztemperatur des Stearins am die Stelle des Stearins.
- 3) Die Schmelztemperatur des Stearins am die Stelle des Stearins.
- 4) Die Schmelztemperatur des Stearins am die Stelle des Stearins.
- 5) Die Schmelztemperatur des Stearins am die Stelle des Stearins.

Abtheilung des Stearins in die Kinetik

vom 20. September 1807.

1. Verhalten des Stearins.

Das Stearin zeigt eine sehr geringe Löslichkeit in Wasser und eine sehr geringe Löslichkeit in Alkohol. Die Schmelztemperatur des Stearins beträgt 70 Grad Celsius. Die Schmelztemperatur des Stearins beträgt 70 Grad Celsius. Die Schmelztemperatur des Stearins beträgt 70 Grad Celsius. Die Schmelztemperatur des Stearins beträgt 70 Grad Celsius. Die Schmelztemperatur des Stearins beträgt 70 Grad Celsius.

2. Verhalten des Stearins.

Das Stearin zeigt eine sehr geringe Löslichkeit in Wasser und eine sehr geringe Löslichkeit in Alkohol. Die Schmelztemperatur des Stearins beträgt 70 Grad Celsius. Die Schmelztemperatur des Stearins beträgt 70 Grad Celsius. Die Schmelztemperatur des Stearins beträgt 70 Grad Celsius. Die Schmelztemperatur des Stearins beträgt 70 Grad Celsius. Die Schmelztemperatur des Stearins beträgt 70 Grad Celsius.